

DISLIPIDEMIA PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE

Portaria Conjunta nº 8, de 30 de julho de 2019

Medicamentos

- Ácido Nicotínico 250 mg, 500 mg e 750 mg – comprimido de liberação prolongada
- Atorvastatina 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg – comprimido
- Bezafibrato 200 mg – drágea ou comprimido e 400 mg – comprimido de desintegração lenta
- Ciprofibrato 100 mg – comprimido
- Fenofibrato 200 mg – cápsula e 250 mg – cápsula de liberação retardada
- Genfibrozila 600 mg e 900 mg – comprimido
- Pravastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg – comprimido

CID's contemplados: E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de Sergipe

1ª solicitação

PARA ÁCIDO NICOTÍNICO:

- Descrição, no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) do fator de risco cardiovascular apresentado pelo paciente:
 - o Diabetes melito;
 - o Risco cardiovascular definido pelo Escore de Risco de Framingham;
 - o Evidência clínica de doença aterosclerótica.
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tireoestimulante); - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – colesterol total- realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos- realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo LDL pela equação de Friedewald- realizado nos últimos 3 meses;

Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
 - o β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.
- Descrever, no campo “Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?” do LME se paciente possui intolerância ou contraindicação ao tratamento com estatinas.

PARA ATORVASTATINA E PRAVASTATINA:

- Descrição, no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) do fator de risco

cardiovascular apresentado pelo paciente:

- o Diabetes melito;
- o Risco cardiovascular definido pelo Escore de Risco de Framingham;
- o Evidência clínica de doença aterosclerótica
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tireoestimulante) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – colesterol total) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo LDL pela equação de Friedewald- realizado nos últimos 3 meses;

Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
o β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.

PARA BEZAFIBRATO, CIPROFIBRATO, FENOFIBRATO E GENFIBROZILA:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tireoestimulante) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos - realizado nos últimos 03 meses;
- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
o β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.

RENOVAÇÃO DA CONTINUIDADE

PARA ATORVASTATINA, PRAVASTATINA E ACIDO NICOTINICO:

Semestralmente ou a cada alteração de dose:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética)
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase).

PARA BEZAFIBRATO, CIPROFIBRATO, FENOFIBRATO E GENFIBROZILA:

Semestralmente ou a cada alteração de dose:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética)
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase).

Semestralmente para os casos de hipertrigliceridemia:

- Dosagem sérica – triglicerídeos.

De posse dos documentos mencionados, o paciente ou seu representante deve dirigir-se ao Centro de Atenção de Saúde de Sergipe – CASE, farmácia de dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Estado de Sergipe, para entrega dos documentos e dispensação do medicamento.

Caso não possa comparecer, o paciente poderá designar representantes para a retirada do medicamento na unidade responsável.

Para o cadastro de representantes, serão exigidos os seguintes documentos:

- I – [Declaração autorizadora](#);
- II – Cópia de documentos pessoais do representante: documento de identidade e comprovante de endereço com CEP;
- III – Número de telefone do representante.