SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE


ESTADO DE
SERGIPE

Óbitos infantis
1° quadrimestre/2026


Cristina Valente Leal
Médica pediatra - CEPMMIF

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES, última atualização em 12/05/2026

Coeficiente de mortalidade infantil 2015 - 2025




N° Partos prematuros 2016 - 2025




	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total	3237	3403	3565	3127	3128	3027	3055	3433	3150	3204


Número absoluto de óbitos janeiro-abril/2021-2026



Número absoluto de óbitos janeiro-abril/2021-2026




N° Nascimentos Janeiro-abril/2021-2026




	2021	2022	2023	2024	2025	2026
nascimentos	10299	10178	10099	9460	9247	9363

Número absoluto de óbitos janeiro-abril/2021-2026




Distribuição dos óbitos infantis de acordo com município de residência janeiro-abril 2026




	Aracaju	Itabaiana	São Cristóvão	Nossa Senhora do Socorro	Tobias Barreto
n	42	11	10	8	6


Distribuição dos óbitos de acordo com a faixa etária janeiro- abril 2026




Peso ao nascer janeiro-abril/2026




	1g a <100g	101g a <500g	501g a <1Kg	1kg a 1,4kg	1,5Kg a 2,4Kg	2,5Kg a 2,9Kg	3Kg a 3,9Kg	4Kg e +	ignorado
2026	0	11%	32%	15%	13%	10%	13%	1%	5%



Semanas de gestação janeiro-abril 2026



	Ignorado	Menos 22	22 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 e +	N inf
2025	0%	11%	32%	16%	16%	19%	0%	5%



Principais causas dos óbitos janeiro-abril 2026

CID 10	N°	%
Causas relacionadas com Prematuridade (P07/P22/P25-P26/P52/P77)	31	20,8%
Q00-Q99 Malformações	22	14,7%
P36 Septicemia bacter do recem-nascido	20	13%
P00 Fet rec-nasc afet afec mat n obr rel grav at	10	7%
P01 Fet rec-nasc afet complic maternas gravidez	9	6%
P02 Fet rec-nasc afet compl plac cord umb membr	7	5%
A41 Outr septicemias	5	3%
P96 Outr afeccoes originadas periodo perinatal	5	3%
J21 Bronquiolite aguda	4	3%

Principais causas de óbitos de prematuros tardio e à temo (n=53)

Q00 - Q99 Manlformações	17	32%
P20 Hipoxia intra-uterina	3	6%
P77 Enterocolite necrotizante do feto e rec-nasc	3	6%
J18 Pneumonia p/microorg NE	2	4%
J21 Bronquiolite aguda	2	4%
P00 Fet rec-nasc afet afec mat n obr rel grav at	2	4%

Óbitos na faixa etária 0 a 6 d

P07 Transt rel gest curt dur peso baix nasc NCOP	16	20%
P00 Fet rec-nasc afet afec mat n obr rel grav at	9	11%
P01 Fet rec-nasc afet complic maternas gravidez	9	11%
P36 Septicemia bacter do recem-nascido	7	9%
Q 00 – Q 99 Malformações	7	9%
P02 Fet rec-nasc afet compl plac cord umb membr	6	7%

Óbitos na faixa etária 7 - 27 DV

P36 Septicemia bacter do recem-nascido	11	38%
Q 00 - Q 99 Malformções	7	24%
P77 Enterocolite necrotizante do feto e rec-nasc	4	14%

Óbitos na faixa etária de 28 a menor 1 ano

Q00-Q99 Malformações	7	23%
A41 Outr septicemias	5	16%
J18 Pneumonia p/microorg NE	2	6%
J21 Bronquiolite aguda	2	6%
Q21 Malformacoes congen dos septos cardiacos	2	6%
Q24 Outr malformacoes congen do coracao	2	6%
R99 Outr causas mal definidas e NE mortalidade	2	6%

Critérios de evitabilidade segundo a lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema único de Saúde do Brasil - janeiro-abril 2026

Lista de óbitos evitáveis por intervenções no Sistema Único de Saúde	Jan-abril 2024
1.1 Preveníveis por imunoprevenção	0 %
1.2.1 - Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação	24,1 %
1.2.2 - Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto)	6,0 %
1.2.3 - Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido	32 %
1.3 - Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento	10 %
1.4 - Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	1 %
2. Causas mal definidas	1 %
3. Não claramente evitáveis	25,9 %

74,1 % EVITÁVEIS

38 % falha na assistência à mulher no parto e ao Rn

Conclusões

1. A maior parte dos óbitos ocorreram entre residentes do município de Aracaju;

2. A faixa etária predominante dos óbitos é a neonatal precoce (55 %)

3. 19 % foram crianças que nasceram à termo;

4. 58 % eram crianças com muito baixo peso ao nascer (< 1.500 g);

5. 74,1 % dos óbitos foram considerados evitáveis de acordo com a Lista de causas de mortes evitáveis por intervenção do Sistema Único de Saúde do Brasil;

6. 38 % eram evitáveis por adequada atenção à mulher no parto ou ao recém-nascido;

7. A principal causa dos foram as malformações em geral, dentre elas as principais foram as malformações cardíacas.

Av. Augusto Franco, 3150 - Ponto Novo
Aracaju - Sergipe, 49097-670
www.saude.se.gov.br